

پیشگیری :

به منظور حفظ سلامت جسم و روان ، ورزش را در برنامه روزانه قرار دهید . نیم تا یک ساعت پیاده روی در اغلب روزهای هفتگه بسیار مفید می باشد .

حفظ وزن طبیعی در پیشگیری از بروز سرطان نقش مهمی دارد ، رژیم غذایی سالم شامل لبنیات و خودداری از مصرف مشروبات الکلی بسیار تاثیر گذار است . شیر دادن به نوزاد خطر ابتلا به سرطان را کاهش می دهد .

درمان :

در صورتی که مشخص شود توده سرطانی است تصمیم گیری برای درمان با مشورت با شما انجام می شود . معمولاً یک مشاوره جراحی یا سرطان شناسی نیز انجام می شود . تصمیم گیری در ارتباط با نوع درمان بر اساس سن ، میزان پیشرفته و گسترش سرطان و نوع سرطان گرفته می شود . درمان های احتمالی جراحی شامل برداشت بافت یا توده سرطانی و ماستکتومی می باشد ، ممکن است بخشی از غدد لنفاوی زیر بغل هم برداشته شوند . سایر گزینه های درمانی شامل پرتو درمانی ، شیمی درمانی و هورمون درمانی می باشد ، این روش های درمانی ممکن است به صورت ترکیبی و یا منفرد استفاده شوند .



توصیه های پس از عمل جراحی

- در معرض نور آفتاب قرار نگیرید .
- در سمت مبتلا از اقدامات تهاجمی نظیر خون گیری و گرفتن فشار خودداری کنید .
- از بلند کردن اجسام سنگین تر از ۵/۲ کیلو خودداری کنید .
- اگر پوست دچار زخم شد آن را با آب و صابون بشویید .
- در صورت مشاهده قرمزی و تورم به پزشک مراجعه کنید .
- از خود تراش برقی جهت برداشتن موهای زاید خود استفاده کنید .
- از پوشیدن لباس های تنگ خودداری کنید .



سایت بیمارستان: kazeroonhp.sums.ac.ir

شماره تلفن: 07142227080 داخلي: 306



يا من اسمه دواء و ذكره شفاء

راهنمای بیمار
سرطان پستان



تشحیص

• بسیاری از خانم‌ها یا به طور اتفاقی و یا از طریق خودآزمایی سینه، به سرطان سینه پی‌می‌برند. در برخی موارد سرطان سینه در معاینات و یا از طریق غربالگری ماموگرافی تشخیص داده می‌شود.

• ماموگرافی یک تصویربرداری ساده به وسیله اشعه ایکس است که به منظور جستجوی اوده‌های سرطانی به کار می‌رود. این ابزار تشخیصی این قابلیت را دارد که قبل از اینکه توده قابل لمس باشد، آن را تشخیص دهد.

• علاوه بر روش‌هایی که برای تشخیص ذکر شد بنا به ضرورت از ام آر آی و نمونه برداری از کیست یا توده هم، جهت تشخیص قطعی کمک گرفته می‌شود. در مواردی که نمونه گیری از توده لازم باشد غالباً محل توده با یک ماده بی‌حس کننده، بی‌حس می‌شود و توسط یک سوزن یا برش جراحی، بخشی از توده یا مایع درون کیست برای بررسی های آزمایشگاهی برداشته می‌شود.

پیش‌آگهی


میزان بقا و زنده ماندن بیماران مبتلا به سرطان سینه رو به بهبود است. اگر خانم‌ها به طور منظم خودآزمایی پستان را انجام دهند، بیشتر سرطان‌ها در همان محل ابتدایی تشخیص داده می‌شوند. بیشتر سرطان‌ها قبل از اینکه قابل لمس باشند، آشکار می‌شوند و این موضوع به میزان زیادی شانس ابتلا را افزایش می‌دهد.

علایم و نشانه‌ها:

اولین علامت سرطان سینه، وجود یک توده در سینه است این توده غالباً قسمت فوقانی خارجی سینه مشاهده و لمس می‌شود. عموماً بدون درد است و ممکن است رشد آهسته یا سریعی داشته باشد. سایر علایم سرطان عبارتند از:

- ۱- تغییر رنگ سینه -۲- ظاهر دانه دانه -۳- پوست مثل پرقال -۴- تغییر در اندازه و شکل سینه و وجود ترشح از نوک سینه -۵- چروکیدگی پوست سینه -۶- تورفتگی و اوارونه شدن وک سینه -۷- بزرگ شدن غدد زیر بغل

هر گونه علامتی در سینه که بیش از چند روز به طول انجامد نیازمند بررسی و ارزیابی از سوی اعضاء تیم سلامت می‌باشد.



سرطان سینه یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در میان زنان می‌باشد که از هر ۸ نفر زن یک نفر به آن مبتلا می‌شود و مهمترین عامل مرگ و میر در بین زنان ۴۵-۵۵ سال می‌باشد. اگر این سرطان در مراحل اولیه تشخیص داده شود، قابل درمان است و میزان شیوع آن در زنان بیشتر از مردان است.

علل و عوامل:

علت بروز سرطان سینه ناشناخته است. هر خانمی ممکن است به سرطان سینه مبتلا شود اما برخی افراد نسبت به بقیه مستعد تر هستند. موارد زیر فرد را مستعد ابتلا به سرطان سینه می‌کند:

جنس: در زنان ۱۰۰ برابر زنان اتفاق می‌افتد.

سن: افزایش سن منجر به افزایش احتمال سرطان سینه می‌شود. به طوری که ۸۰ درصد سرطان‌ها بعد از ۵۰ سالگی اتفاق می‌افتد.

ژنتیک: ابتلا یکی از بستگان درجه یک شانس ابتلا را دو برابر می‌کند. سرطان پستان یک سمت احتمال ابتلای سمت دیگر را سه برابر می‌کند.

شروع قاعده‌گی قبل از ۱۲ سالگی و یائسگی بعد از ۵۵ سالگی احتمال ابتلا را افزایش می‌دهد.

صرف زیاد مشروبات الکلی نیز شانس ابتلا را افزایش می‌دهد.