

یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

راهنمای بیمار

عفونت ادراری در کودکان



۵. ادرار کردن هر ۳-۴ ساعت یک بار انجام شود و از یبوست کودک نیز جلوگیری شود.

۶. برای کودکان از لباس های زیر نخی و گشاد استفاده کنید و به طور مکرر شست و شو و تعویض نمایید.

۷. از نشاندن کودکان در وان یا لگن خودداری کنید.

۸. اگر کودکی ادرارش را زیاد نگه می دارد یا بالعکس به فاصله زمانی کوتاه و تند تند به دست شویی می رود یا یبوست دارد ، بلافاصله برای درمان این مشکل کودک خود اقدام نمایید.



۴. در صورت وجود درد در پشت و پهلوها از یک کیسه آب گرم استفاده کنید.

۵. در صورت وجود درد در هنگام ادرار کردن حتما به پزشک اطلاع دهید.

اقداماتی جهت پیشگیری و بهبود وضعیت کودک :

۱. به کودک یاد بدهید که حتما بعد از استفاده از دست شویی ، محل خروج ادرار را به طور صحیح با آب بشویید . (از جلو به عقب)

۲. به کودک یاد بدهید بهداشت را رعایت کند.

۳. والدین نباید به کودکان توصیه کنند که خارج از منزل به دست شویی نروند و حتما هر زمان که بچه احساس نیاز کرد باید از دست شویی استفاده کند.

۴. کودکانی که عفونت ادراری دارند باید مایعات بیشتری مصرف کنند.


سایت بیمارستان: kazeroonhp.sums.ac.ir

شماره تلفن: 07142227080 داخلی: 306



عفونت ادراری چیست ؟

عفونت ادراری بیماری اسن که در اثر وارد شدن میکروب به مجاری ادرار ایجاد می شود.



علت عفونت ادراری :

یکی از علل مهم می تواند برگشت ادرار از مثانه به کلیه ها باشد و معمولا در دختر بچه ها بیشتر دیده می شود ، بنابراین در صورت وجود برگشت ادرار ، پی گیری کامل ضروری است .

در پسر بچه ها یکی از زمینه های مهم عفونت ختنه نشدن است بنابراین ختنه در سنین پایین تر از یک سال توصیه می شود.

علائم :

- * درد یا سوزش هنگام دفع ادرار
- * تکرر ادرار که گاه می تواند سبب شب ادراری شود.
- * تب
- * بوی تند ادرار و کدر شدن رنگ آن
- * درد در قسمت پایین شکم ، درد پایین کمر (در صورت عفونت قسمت های فوقانی سیستم ادراری و کلیه ها .)
- * وجود خون در ادرار



تشخیص :

مشاهده علائم ذکر شده در بالا ، آزمایش و کشت ادرار

درمان :

اگر دستگاه ادراری تحتانی (مثانه) درگیر باشد ، درمان سرپایی با آنتی بیوتیک به مدت ۳ تا ۵ روز و اگر عفونت در کلیه ها باشد ، کل مدت درمان ۱۰ تا ۱۴ روز است که بسته به حال عمومی بیمار به صورت سرپایی یا بستری شدن در بیمارستان می باشد.

نخستین اقداماتی که شما می توانید

انجام دهید :

۱. اگر کودک از درد در هنگام ادرار کردن شکایت دارد نخست درجه حرارت بدن او را از نظر وجود تب کنترل کنید .
۲. بو رنگ ادرار را بررسی کنید .
۳. برای افزایش حجم ادرار و کمک به کار کلیه ها مایعات فراوان به کودک بدهید.

