


یا من اسمه دوae و ذکره شفاء

راهنمای بیمار

قرص اسید فولیک



موارد احتیاط

اسید فولیک ندرتا سمی است . مصرف زیاد آن بدون تجویز پزشک می تواند باعث مشکلات معده ، مشکلات خواب ، واکنش های پوستی و تشنج شود . مکمل های اسید فولیک کمبود ویتامین B12 را که می تواند باعث آسیب دائمی به سیستم عصبی شود ، مخفی نگه دارد . مکمل های اسید فولیک باید همیشه ویتامین B12 نیز به همراه داشته باشند .

عوارض جانبی

۱- درد و کوفتگی عمومی بدن ۲- خارش ، بثورات تنفسی ، تنگی نفس کسالت عمومی



ایران وی
IRANWE.COM



سایت بیمارستان: kazeroonhp.sums.ac.ir

شماره تلفن: 07142227080 داخلی: 306



توجه:

* مصرف همزمان داروهای ضد بارداری با مواد غذایی حاوی ویتامین B ، باعث کاهش جذب این ویتامین می گردد . به طور مثال خانم های مصرف کننده این داروها اغلب کمبود ویتامین B6 و B9 (اسید فولیک) دارند .

* همراه با چای و قهوه ، لبنیات ممکن است به صورت کمپلکس نامحلول درآید.

* جهت جذب بهتر این دارو یک ساعت قبل از مصرف آن تا یک ساعت بعد از مصرف آن لطفا چایی و لبنیات مصرف نکنید .

فولیک اسید

- ♦ فولیک اسید که به نام های فولات یا ویتامین B9 نیز خوانده می شود . با این تفاوت که اسید فولیک در بدن ساخته می شود در حالی که فولات شکل طبیعی آن است و در برخی از غذاها یافت می شود. این ویتامین ، بدن را در مقابل بیماری های قلبی ، نقص های مادرزادی ، پوکی استخوان و سرطان های مشخصی حفظ میکند.
- ♦ هر فردی به اسید فولیک برای ساخت گلbulوں های قرمز طبیعی نیاز دارد و کمبود آن می تواند منجر به کم خونی شود .
- ♦ فولیک اسید از طریق ادرار دفع می شود و بایستی با خوردن غذاهای غنی از فولات یا مصرف قرص فولیک اسید جایگزین شود .
- ♦ زنان در سنین باروری نیاز بیشتری به فولیک اسید دارند زیرا این ویتامین در پیشگیری از نقایص عمدۀ مغزی و نخاع کمک کننده است.
- ♦ در صورتی که خانمی قبل از بارداری ذخایر کافی فولیک اسید در بدن داشته باشد می تواند از بروز این نقایص مادرزادی جلوگیری کند .

- ♦ در واقع زنانی که قبل و حین بارداری کمبود اسید فولیک دارند به شدت در معرض خطر بروز نقایص مادرزادی می باشند .
- ♦ پختن بیش از اندازه غذاها یا نگه داشتن غذا در حرارت اتاق به مدت طولانی و یا نداشتن رژیم مناسب و کمبود مصرف میوه و سبزیجات تازه منجر به کمبود این ویتامین می شود .
- ♦ بدن فولات را به راحتی فولیک اسید مورد مصرف قرار نمی دهد . علاوه بر این به راحتی ممکن است یک رژیم غذایی سالم و متعادل نیز به تنهایی نیازهای غذایی روزانه را برآورده سازد . بنابراین مصرف روزانه قرص فولیک اسید توصیه می شود .
- ♦ دریافت روزانه اسید فولیک در زمان مشخصی از روز و به صورت منظم به جذب هر چه بیشتر آن کمک می کند .

منابع غذایی

- ۱- انواع مرکبات -۲- برگ سبزیجات با رنگ سبز تیره -۳- جگر -۴- عدس -۵- آرد سویا -۶- بادام زمینی -۷- اسفناج -۸- برگ شلغم -۹- کدو تنبل -۱۰- گندم



افرادی که به فولیک اسید نیاز بیشتری دارند :

- ♦ مبتلایان به کم خونی هموگلوبین و کم خونی داسی شکل
- ♦ مبتلایان به بیماری های گوارشی از جمله سیلیاک ، بیماری های کلیوی و کبدی و افراد تحت دیالیز
- ♦ زنان سنین باروری
- ♦ مصرف کننده های داروهای ضد ضربع ، داروهای درمان کننده دیابت ، برخی آنتی بیوتیک ها برخی از داروهای خواب آور
- ♦ مبتلایان به دیابت نوع دو ، آرتربیت روماتوئید ، لوبوس ، پسوریازیس

